



L'Hôpital de Montréal pour enfants
The Montreal Children's Hospital
Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

SOINS À DOMICILE APRÈS UN TRAITEMENT AU LASER

Pour votre prochain rendez-vous, appelez au 514-412- _____

Clinique : _____

Médecin : _____

Type de suivi recommandé : en clinique par téléphone autre _____

ACTIVITÉ : Activité paisible sous surveillance étroite aujourd'hui, jour de l'opération.
Reprise des activités normales dès demain.
Demandez l'avis de votre médecin en ce qui a trait à la reprise des activités physiques.

ÉCOLE : L'enfant peut retourner à l'école dès demain.

BAIN : L'enfant peut prendre un bain dès demain.

DIRECTIVES

SPÉCIFIQUES : Appliquez de l'onguent Bacitracine sur la zone traitée 2 fois par jour durant 10 jours. Évitez toute exposition directe au soleil durant 2 mois. Appliquez de l'écran solaire (FPS 30) pour protéger la peau du soleil. Les contusions disparaîtront en une dizaine de jours.

MÉDICAMENTS : Pour soulager la douleur, donnez de l'acétaminophène (Tylenol ou Tempra) toutes les 4 heures au besoin. La prochaine dose doit être donnée à ____heures seulement.

DIÈTE : Donnez de l'eau, du jus de fruit, un popsicle, du soda au gingembre dégazé ou du jello à votre enfant au cours des deux premières heures. S'il garde bien le tout, continuez avec des aliments mous comme de la soupe, du yogourt, de la crème glacée et des céréales. Demain, il pourra manger normalement.

***** AVIS IMPORTANT AUX PARENTS *****

SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES, VEUILLEZ APPELER À L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS AU 514-412-4400 ET DEMANDEZ LE MÉDECIN DE GARDE EN CHIRURGIE PLASTIQUE OU RENDEZ-VOUS À L'URGENCE DE L'HÔPITAL.

Révisée en 2009

Thao Le, inf. & Julie Drolet, inf. - Clinique d'évaluation préopératoire

Unité de soins post-anesthésiques

Unité de chirurgie 7C