

UNE ORCHIDOPEXIE

Chers parents, votre enfant vient de subir une orchidopexie et il est prêt à rentrer à la maison. Une orchidopexie est une intervention chirurgicale qui permet de fixer de façon permanente le testicule non descendu à l'intérieur du scrotum. Les renseignements suivants vous aideront à assurer le prompt rétablissement de votre enfant à sa sortie de l'hôpital.

Soins de la région opérée

- Il n'y a pas de soin particulier de la plaie, mais il faut garder l'endroit opéré propre et sec.
- Il y aura une incision dans le pli de peau de la région inguinale (l'aîne). Des bandages adhésifs renforcés appelés steri-strips peuvent être appliqués directement sur la plaie. Laissez-les en place et ne les retirez pas, sauf s'ils sont encore en place dix jours suivant l'opération. Un pansement en plastique transparent ou un pansement de gaze couvrira l'incision. Le chirurgien vous indiquera comment et quand retirer le pansement à la maison. Il y aura des ecchymoses et une enflure pendant au moins 3 à 5 jours.
- Si la chirurgie est réalisée par le scrotum, les points de suture se dissoudront naturellement au cours du processus de guérison, dans 10 à 14 jours.

Soulagement de la douleur

- Donnez de l'acétaminophène (Tyléno® ou Tempra®) toutes les 4 heures si nécessaire; cependant, il ne faudrait pas donner plus de 5 doses au total en 24 heures. La prochaine dose peut seulement être donnée à _____ heures.
- D'autres médicaments pourraient être prescrits. **Il est très important de suivre exactement le dosage et la fréquence d'administration prescrits.**
- Consultez des autres renseignements donnés sur la gestion de la douleur.

Quand la vie redeviendra-t-elle normale ?

- **Activités:** aujourd'hui, des activités calmes sous surveillance étroite sont recommandées.
- **Après 24 heures :**
 - Moins de 4 ans : aucune restriction, mais une surveillance étroite est recommandée ; pas de jouets à enfourcher pendant 10 jours.
 - De 4 à 10 ans : pas de vélo, de gym ou de sport de contact pendant 2 semaines.
 - Plus de 10 ans : pas de vélo, de gym ou de sport de contact pendant 4 à 6 semaines ; pas de sport de compétition pendant 2 à 3 mois.
- **Bain :** bain à l'éponge au cours des 48 premières heures, puis commencez les bains ou les douches.
- **Alimentation :** donnez de l'eau, du jus de pomme, des Popsicles, du Ginger Ale éventé (sans bulles) ou du Jell-O pendant une à deux heures. Si cela est bien toléré, commencez une alimentation de consistance molle comme de la soupe, des yogourts, de la crème glacée et des céréales. Demain, votre enfant pourra reprendre une alimentation normale.
- **École / garderie :** votre enfant pourra retourner à l'école / la garderie dans 3 à 5 jours.

Quand appeler le médecin ?

- La douleur ne diminue pas, même après avoir donné les médicaments prescrits.
- La fièvre est encore à 38,5° C (101° F) ou plus, 48 heures après la chirurgie.
- Des rougeurs et l'enflure autour de l'incision.
- L'écoulement ou le saignement au site de l'incision.

Suivi

- Composez le 514-934-1934, poste _____ pour demander un rendez-vous de suivi
- Clinique _____ Docteur: _____
- Type de suivi recommandé : en clinique par téléphone autre

Besoin de renseignements?

SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES, VOUS POUVEZ APPELER L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS AU 514-934-1934 ET DEMANDER LE MÉDECIN DE GARDE POUR LE SERVICE _____
OU PRÉSENTEZ-VOUS À L'URGENCE DE L'HÔPITAL

Attention : L'information contenue dans ce document est donnée à titre indicatif. Elle ne remplace pas l'avis médical ou les conseils donnés par un professionnel de la santé et ne se substitue pas à des soins médicaux. Contactez un professionnel de la santé qualifié si vous avez des préoccupations concernant les soins de votre enfant.

ORCHIDOPEXY

Dear Parents, your child has just had an orchidopexy and is ready to go home. An orchidopexy is a surgery to move an undescended testicle into the scrotum and permanently fix it there. This following information will help ensure your child has a safe recovery after leaving the hospital.

Care for the surgical site

- No special wound care, but keep the area dry and clean.
- There will be an incision in the inguinal (groin) skin crease. Reinforced sticky tapes called steri-strips may have been applied directly on the wound. Leave them in place and do not pull them off; unless they will not fall off on their own after 10 days after surgery. A clear plastic dressing or a gauze dressing will cover the incision. Remove the dressing at home as instructed by the surgeon. Some bruising and swelling may be seen for at least 3-5 days.
- If the surgery is performed through the scrotum, a dissolvable suture is present that will fall out as the healing progresses, within 10 to 14 days.

Pain Management

- Give acetaminophen (Tylenol® or Tempra®) every 4 hours if needed, but no more than 5 doses total in 24 hours. Next dose may be given only at _____ hours.
- Other medications might be prescribed. **It is very important to follow the exact dosage and frequency prescribed.**
- Refer to other instructed pain management information.

When will life go back to normal?

- **Activity:** Quiet activities today with close supervision.
After 24 hours:
 - Under 4 years old: no restriction but close supervision, no straddle toys for 10 days;
 - 4-10 years old: no bicycle, gym, or contact sports for 2 weeks;
 - Over 10 years old: no bicycle, gym, or contact sports for 4-6 weeks; no competitive sports for 2-3 months.
- **Bathing:** Sponge bath for the first 48 hours, then begin tub baths or shower.
- **Diet:** Give water, apple juice, Popsicle, flat ginger ale or Jell-O for one to two hours. If tolerated, proceed to a soft diet such as soup, yogurt, ice cream and/or cereal. The day after surgery, your child may take a normal diet.
- **School / Daycare:** May go back to school/daycare after 3-5 days.

When to call the doctor?

- Pain that does not lessen even after giving your child the prescribed medications.
- A fever of 38.5°C (101°F) or higher, 48 hours after the surgery.
- Increased redness and swelling around the incision.
- Drainage or bleeding from the incision.

Follow-up

- For your next appointment please call 514-934-1934, extension: _____
- Clinic _____ Doctor: _____
- Type of follow-up recommended: in clinic by phone other _____

Contact Information

IF CONCERNED, PLEASE CALL THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL AT 514-934-1934 AND ASK FOR THE PHYSICIAN ON CALL FOR THE _____ SERVICE OR COME TO THE EMERGENCY ROOM OF THE HOSPITAL.

Disclaimer: Information provided by this pamphlet is for educational purposes. It is not intended to replace the advice or instruction of a professional healthcare practitioner, or to substitute for medical care. Contact a qualified healthcare practitioner if you have any questions concerning the care of your child.