

Quand faut-il amener votre enfant à l'urgence ?

Vous êtes sûrement le meilleur juge de l'état de santé de votre enfant. Il peut toutefois être difficile de déterminer à quel point votre enfant est malade et s'il faut l'amener à l'urgence. Heureusement, il y a des signes qui peuvent vous guider.

Écoutez et observez votre enfant pour détecter signes suivants

Pensez à consulter si vous répondez « **oui** » à l'une de ces questions :

Couleur de la peau

La peau de votre enfant est-elle plus pâle que d'ordinaire ?

Hydratation

Votre enfant a-t-il la bouche sèche (absence de salive) ? Constatez-vous une absence de larmes quand votre enfant pleure ? Est-ce que votre enfant urine moins fréquemment ?

Respiration

Votre enfant a-t-il de la difficulté à respirer ? Le rythme respiratoire de votre enfant a-t-il changé ?

Réactions

Votre enfant montre-t-il des signes d'apathie, de fatigue ou d'irritabilité ? Est-ce que la façon dont votre enfant vous répond a changé ? Est-ce que la façon dont votre enfant réagit aux bruits ou à la stimulation visuelle a changé ?

URGENCE - EMERGENCY



Si votre enfant a de la fièvre :

Si votre enfant a une infection (causée par une bactérie ou un virus), c'est normal qu'il ait de la fièvre aussi. En soi, la fièvre n'est pas dangereuse pour votre enfant, même si sa température est très élevée. Ses agissements et son comportement sont de bien meilleurs indicateurs de son état de santé.

Si votre enfant a moins de trois mois et a de la fièvre, vous devez consulter un médecin. S'il a plus de trois mois, vous pouvez le soigner à la maison tant et aussi longtemps qu'il reste bien hydraté et que son apparence, son respiration et ses réactions sont appropriées (voir la section précédente). Cependant, si la fièvre dure plus de 48 à 72 heures, votre enfant devrait être examiné par un médecin.

Consultez un médecin ou un professionnel de la santé si :

- votre enfant de moins de trois mois a de la fièvre.
- la fièvre dure depuis plus de 48 à 72 heures.
- votre enfant est excessivement grincheux, difficile ou irritable.
- votre enfant est très somnolent, manque d'énergie ou ne répond pas.
- votre enfant a constamment une respiration sifflante ou difficile.

Lorsque votre enfant a de la fièvre, deux médicaments sont recommandés. Ils peuvent servir à soulager la douleur ou les maux liés à la fièvre, mais ils ne sont pas indispensables.

1. **Acétaminophène** (comme Tylenol^{MC} ou Tempra^{MC})

2. **Ibuprofène** (comme Advil^{MC} et Motrin^{MC})

Quel que soit le médicament, il est très important de respecter les directives figurant sur l'emballage.

Ne donnez pas à votre enfant de l'acétaminophène et de l'ibuprofène en même temps. **Et ne donnez jamais** d'aspirine (acide acétylsalicylique) aux enfants qui ont de la fièvre.

